



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

D.P. 13-3-08014724

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 06 du 11 mars 2008 - 2 pages

Actualité

STADES :

BLE : décollement de l'épi à épi 1-2 cm.

COLZA : l'élongation est toujours plus ou moins prononcée. Boutons cachés (D1) à visibles (D2).

ORGE PTPS : 1 feuille.

POIS-FEVEROLE : germination à levée.

Les semis d'orge de printemps, pois et féverole ne sont pas terminés dans le nord de la région.

Ravageurs colza

On a relevé seulement 2 captures de charançon de la tige du colza sur 42 sites observés. Les captures de méligèthes sont insignifiantes également (8), et les infestations sur plantes rares (1 à 2 méligèthes pour 10 plantes mardi matin dans quelques parcelles du Vexin), dans l'attente de meilleures conditions.

Rouille jaune.

De nouvelles parcelles touchées ont été détectées dans la Somme, sur les variétés TOISON-DOR, HYSUN, ALTIGO, MENDEL, NIRVANA, KORELI... (Source SRPV Picardie).

Restez vigilant notamment sur toutes les variétés précédemment citées.


Premières pustules de rouille brune sur une parcelle de SANKARA à Maisoncelles en Brie (77).

Thrips

Des thrips étaient encore visibles ce lundi, notamment dans le sud de la région, mais en plus faible proportion que la semaine passée, compte tenu des conditions climatiques :

- de 1 à 2 thrips pour 10 pieds sur pois à Roinvilliers (91), Château-landon (77), sur féverole à Marly la ville (95), Villecerf (77),
- et jusqu'à 1 à 2 thrips par pied sur un pois à Egreville (77).

Surveillez les parcelles au retour de conditions plus favorables.



Thrips sur pois - secteur Videlles (91)
la semaine passée

(photo : Soufflet Agriculture)

En bref

Régulateur colza

Le recours à un régulateur sur colza doit être raisonné en fonction du risque de verse. Voir les publications du CETIOM sur le sujet.

Compte tenu de son Délai Avant Récolte important (120 jours), l'usage du PARLAY C devient délicat à cette période.

Sclérotinia

La coopérative Valfrance signale la présence de sclérotinia du collet sur une parcelle de colza à Villiers en Bière (77). Le précédent colza datait de 2006, et il avait eu une forte attaque de sclérotinia.

L'an passé, avec un hiver encore plus doux, des symptômes avaient été détectés dès fin janvier - début février. Aucune lutte chimique n'est efficace contre ce type d'attaque. Seule l'utilisation préventive de la lutte biologique avec le CONTANS WG peut limiter les attaques.



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et
Interdépartementale de
l'Agriculture et de la
Forêt

Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
N. THERRE

Publication périodique
C.P.A.P.
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2008:
87 euros (papier)
76 euros (fax)
68 euros (mail)

DS 5070 48755

BnF
S&T

P174

Piétin verse

Les infos de la plaine

Nous avons réalisé les premières observations sur des parcelles en blé sur blé. Le niveau moyen d'attaque est de 10%, soit légèrement en dessous de la valeur de l'an passé à la même date, et avec la même disparité. Sur 14 parcelles, on a :

- 2 situations avec la variété PR22R28 : 0% d'attaque,
- 7 situations d'autres variétés entre 0 et 4% de piétin verse,
- 3 parcelles entre 10 et 20% d'attaque,
- 1 parcelle à 28% de piétin-verse,
- enfin 1 cas à 60% d'attaque (TOISONDOR en 3ème blé).

Les infos du modèle

De nouvelles contaminations secondaires ont été enregistrées courant février et début mars. A ce jour, entre 1/3 et 1/2 des contaminations théoriques ont donné des symptômes.

En terme d'indice de risque, qui traduit l'importance des contaminations, on reste toujours à un niveau moyen, proche de celui de l'an passé.

La situation peut encore évoluer dans le courant du mois de mars et d'ici le stade 1-2 noeuds.


Bilan climatique

Sur le plan des températures, février a été supérieur à la normale (6,6° contre 4,4°) mais moins que l'an passé (8,3°).


Pour la pluviométrie, le cumul moyen (42 mm) est proche de la normale (48 mm), avec des pluies surtout en début de mois. On note toutefois des valeurs assez faibles dans le nord des Yvelines (voir carte).

Indice de risque piétin au 10 février selon modèle TOP

comparaison entre années sur une vingtaine de postes météo



PLUVIOMETRIE DE FEVRIER



Source : © IGN BD-CARTO / Données Météo France, DIREN - SERHAC, DRIAF - SRISE - DRIAF SRPV